

四庫全書

子部

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑卷九十

編輯正骨心法要旨目錄

內治雜證法

方法總論

傷損內證

傷損出血

瘀血泛注

瘀血作痛

血虛作痛

嘔吐黑血

發熱

肌肉作痛

骨傷作痛

胸腹痛悶

脇肋脹痛

腹痛

少腹引陰莖作痛

腰痛

眩暈

煩躁

喘咳

昏憤

作嘔

作渴

秘結

挾表

補遺方

御纂醫宗金鑑卷九十目錄

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑卷九十

編輯正骨心法要旨

內治雜證法

方法總論

今之正骨科即古跌打損傷之證也專從血論須先辨或有瘀血停積或為亡血過多然後施以內治之法庶不有誤也夫皮不破而內損者多有瘀血破肉

傷腫每致亡血過多二者治法不同有瘀血者宜攻利之亡血者宜補而行之但出血不多亦無瘀血者以外治之法治之更察其所傷上下輕重淺深之異經絡氣血多少之殊必先逐去瘀血和榮止痛然後調養氣血自無不效若夫損傷雜證論中不及備載者俱分門晰類詳列於後學者宜盡心焉

傷損內證

凡跌打損傷墜墮之證惡血留內則不分何經皆以肝為主蓋肝主血也故敗血凝滯從其所屬必歸於肝其痛多在脇肋小腹者皆肝經之道路也若壅腫痛甚或發熱自汗皆宜斟酌虛實然後用調血行經之藥王好古云登高墜下撞打等傷心腹胸中停積瘀血不散者則以上中下三焦分別部位以施藥餌瘀在上部者宜犀角地黃湯瘀在中部者宜桃仁承氣湯瘀在下部者

宜抵當湯之類。須於所用湯中加童便好酒同煎服之。
虛人不可下者，宜四物湯加穿山甲，若瘀血已去，則以
復元通氣散加當歸調之。內經云：形傷作痛，氣傷作腫。
又云：先腫而後痛者，形傷氣也；先痛而後腫者，氣傷形
也。凡打撲閃錯，或惱怒氣滯，血凝作痛，及元氣素弱，或
因叫號，血氣損傷，或過服剋伐之劑，或外敷寒涼之藥，
致氣血凝結者，俱宜用活血順氣之劑。後列諸方以備
選用。

犀角地黄湯

犀角

生地黄
酒浸另搗

丹皮

白芍
各等分

水煎服

桃仁承氣湯

大黃

芒硝

桃仁

桂枝

甘草

水煎服以利為度

抵當湯

水蛭

蝨蟲

各三十枚
去翅足

大黃

一兩
酒浸

桃仁

三十枚
去皮尖

水煎去渣取三升溫服一升不下再服

復元活血湯

柴胡

五錢

當歸

穿山甲

炮

枯蕒根

各三錢

甘草

紅花 各二錢

桃仁

五十箇
去皮尖

大黃

一兩
酒浸

右將桃仁研爛餘藥剉如麻豆大每服一兩水二
鍾酒半盞煎至七分去渣大溫食前服以利為度

巴戟湯

巴戟

去心

大黃

各半兩

當歸

地黃

芍藥

川芎

各一兩

右為末水煎服以利為度

破血消痛湯

羌活

防風

官桂

各一錢

蘓木

一錢半

柴胡

連翹

當歸梢

各二錢

麝香

少許
另研

水蛭

二錢
炒去煙盡另研

右為粗末共一服酒二大盞水一盞水蛭麝香另

研如泥餘藥煎至一大盞去火稍熱調二味服之

兩服立愈

清心藥

牡丹皮

當歸

川芎

赤芍藥

生地黃

黃芩

黃連

連翹

梔子

桃仁

甘草 各等分

右引用燈心草薄荷煎入童便和服

止痛藥

當歸

牛膝

川芎

懷慶生地

赤芍藥

白芷

羌活

獨活

杜仲

續斷 各一兩

肉桂

八角茴香

乳香

沒藥 各五錢

南木香

丁皮

沉香

血竭 各二錢半

右為末老酒調用

活血順氣何首烏散

何首烏 三錢

當歸

赤芍藥

白芷

烏藥

枳殼

防風

甘草

川芎

陳皮

香附

紫蘓

羌活

獨活

肉桂

各一錢

右薄荷生地黃煎入酒和服

疼痛甚者加乳香沒藥

調經散

川芎

當歸

芍藥

黃耆 各一錢半

青皮

烏藥

陳皮

熟地黃

乳香

另研

茴香 各一錢

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

牡丹皮散

牡丹皮

當歸

骨碎補

紅花
酒浸

續斷

乳香

沒藥

桃仁

川芎

赤芍藥

生地黃

各等分

右水酒煎服却用秫米飯熱罨縛冷又蒸熱換縛

橘木四物湯

當歸

川芎

白芍藥

懷慶生地 各二錢

陳皮

白朮

紅花 各一錢

桃仁 十枚

右生地黃煎服

骨節疼加羌活獨活

痛不止加乳香沒藥

當歸補血湯

當歸

川芎

白芍藥

熟地黄

防風

連翹

羌活

獨活

乳香

沒藥

白芷

續斷

杜仲

各等分

右生地黃煎入童便和服不可用酒

氣虛加人參白朮黃耆

復元通氣散

木香

茴香炒

青皮

去皮

穿山甲

酥炙

陳皮

白芷

甘草

漏蘆

貝母

各等分

右為末每服一二錢溫酒調下

傷損出血

傷損之證或患處或諸竅出血者此肝火熾盛血熱錯經而妄行也用加味逍遙散清熱養血若中氣虛弱血無所附而妄行用加味四君子湯補中益氣湯或元氣內脫不能攝血用獨參湯加炮薑以回陽如不應急加附子如血蘊於內而嘔血者用四物湯加柴胡黃芩凡傷損而犯勞碌或怒氣肚腹脹悶或過服寒毒等藥致傷陽絡者則為吐血衄血便血尿血傷於陰絡者則為

血積血塊肌肉青黑此皆臟腑虧損經隧失職急補脾肺二臟自愈矣

加味逍遙散

白朮

茯苓

當歸

白芍 各二錢

柴胡 一錢

薄荷 五分

黑梔

丹皮 各一錢五分

水煎服

補中益氣湯

人參 二錢

黃耆 二錢
炙

白朮 一錢五分
炒

當歸 一錢五分

升麻 五分

柴胡 五分

陳皮 八分

甘草 三分
炙

引用薑棗水煎服

四君子湯

人參

白朮

茯苓 各二錢

甘草 一錢
炙

引用薑棗水煎服

四物湯

當歸 三錢

川芎

白芍藥 二錢

熟地黃 三錢

水煎服

獨參湯

人參 一兩

水煎服

瘀血泛注

傷損瘀血泛注之證乃跌仆血滯所致蓋氣流而注血注而凝或注於四肢關節或留於胸腹腰臀或漫腫或結塊初起皆屬肝脾鬱火急用葱熨法內服小柴胡湯以清肝火次用八珍湯以壯脾胃或益氣養榮湯久服自然收功若日久潰破而氣血虛者宜十全大補湯若潰而寒邪凝滯不斂者宜豆豉餅祛散之此證若不補

氣血不慎起居不戒七情或用寒涼剋伐俱屬不治

小柴胡湯

柴胡 二錢

黃芩 一錢五分

半夏 製

人參 各一錢

甘草 五分

引用薑二片水煎服

八珍湯

即四君子湯四物湯相和為劑也

益氣養榮湯

人參

黃耆

炒

當歸

川芎

熟地黃

白芍

炒

香附

貝母

茯苓

陳皮

各一錢

白朮

二錢

柴胡

六分

甘草

桔梗

各五分

引用薑水煎服

口乾加五味子麥冬

往來寒熱加青皮

十全大補湯

即八珍湯加黃耆肉桂各一錢

豆豉餅

江西豆豉

右一味為末唾津和作餅子如錢大厚二分置患

處以艾壯於餅上灸之乾則再易

葱熨法

方見內
骨傷

瘀血作痛

傷損之證腫痛者乃瘀血凝結作痛也若脹而重墜色或青黑甚則發熱作渴汗出者乃經絡壅滯陰血受傷也宜先刺去惡血以通壅塞後用四物湯以調之

四物湯

方見傷
損出血

血虛作痛

傷損之證血虛作痛者其證則發熱作渴煩悶頭暈日
晡益甚此陰虛內熱之證宜八珍湯加丹皮麥冬五味
子肉桂骨碎補治之

八珍湯

方見瘀
血泛注

嘔吐黑血

傷損嘔吐黑血者始因打撲傷損敗血流入胃脘色黑
如豆汁從嘔吐而出也形氣實者用百合散形氣虛者
加味芎藭湯

百合散

川芎

赤芍藥

當歸

百合

生地黃

側柏葉

荊芥

犀角

丹皮

黃芩

黃連

梔子

鬱金

大黃

各一錢

水煎加童便和服

加味芎藭湯

芎藭

當歸

白朮

百合
水浸一日

荊芥

各一錢

水一鍾半酒半鍾煎八分不拘時服

發熱

傷損之證發熱者若因出血過多脈洪大而虛重按之

全無者此血虛發熱也用當歸補血湯鯀若沉微按之
軟弱者此陰盛發熱也宜用四君子湯加炮薑附子若
發熱煩躁肉瞤筋惕者此亡血也宜用聖愈湯如發熱
汗出不止者此血脫也宜用獨參湯血脫之證其鯀實
者難治細小者易治

當歸補血湯

黃耆

一兩
炙

當歸
三錢

水煎服

聖愈湯

人參

川芎

當歸

熟地黄

生地

黃耆

各等分
炙

水煎服

四君子湯

獨參湯

俱見傷
損出血

肌肉作痛

傷損之證肌肉作痛者乃榮衛氣滯所致宜用復元通氣散筋骨間作痛者肝腎之氣傷也用六味地黄丸

六味地黄丸

熟地黄

八兩

山萸肉

四兩
去核

懷山藥

四兩

牡丹皮

三兩

澤瀉

三兩

茯苓

三兩

共為末煉蜜丸桐子大空心白湯服三錢

復元通氣散

方見傷損內證

骨傷作痛

傷損之證骨傷作痛者乃傷之輕者也若傷重則或折或碎須用手法調治之其法已詳列前篇此乃磕碰微傷骨間作痛肉色不變宜外用葱熨法內服沒藥丸日間服地黃丸自愈矣

沒藥丸

沒藥

去油

乳香

去油

川芎

川椒

去閉口及目

芍藥

當歸 各半兩

自然銅

二錢半
火煅淬七次

右為細末用黃蠟二兩溶化入藥末攪勻丸彈子

大每服一九酒一鍾化開煎五分熱服

葱熨法

方見
骨傷

地黃丸

方見
肌肉作痛

胸腹痛悶

傷損之證胸腹痛悶者多因跳躍捶胸閃挫舉重勞役

恚怒所致其胸腹喜手摸者肝火傷脾也用四君子湯加柴胡山梔如畏手摸者肝經血滯也用四物湯加柴胡山梔桃仁紅花若胸脇悶痛發熱晡熱肝經血傷也用加味逍遙散若胸脇悶痛飲食少思肝脾氣傷也用四君子湯加芎歸柴梔丹皮若胸腹脹滿飲食少思肝脾氣滯也用六君子湯加柴胡芎歸若胸腹不利食少無寐脾氣鬱結也用加味歸脾湯若痰氣不利脾肺氣滯也用二陳湯加白朮芎歸山梔天麻釣藤鈎如因過

用風熱之藥致肝血受傷肝火益甚或飲糖酒則腎水益虛脾火益熾若用大黃芍藥內傷陰絡反致下血少壯者必成痼疾老弱者多致不起

加味歸脾湯

黑梔 一錢

牡丹皮 一錢

人參 一錢

黃耆 一錢五分

白朮 一錢五分

茯神 二錢

東仁 一錢五分

當歸 一錢

木香

五分

遠志

八分
去心

圓肉

二錢

甘草

五分
炙

引用薑棗水煎服

二陳湯

陳皮

一錢五分

半夏

二錢
製

茯苓

二錢

甘草

五分

引用薑水煎服

六君子湯

即四君子湯加陳皮半夏各一錢五分

引用薑棗水煎服

四君子湯

四物湯

加味逍遙湯

俱見傷損出血

脇肋脹痛

傷損脇肋脹痛之證如大便通和喘咳吐痰者肝火侮肺也用小柴胡湯加青皮山梔清之若胸腹脹痛大便

不通喘咳吐血者乃瘀血停滯也用當歸導滯散通之內經云肝藏血脾統血蓋肝屬木木勝侮土其脾氣必虛宜先清肝養血則瘀血不致凝滯次壯脾胃則氣血充盛若行剋伐則虛者益虛滯者益滯禍不旋踵矣
當歸導滯散

川大黃 一兩

當歸 二錢五分

麝香 少許

右三味除麝香另研外為極細末後入麝香令勻

每服三錢熱酒一杯調下

又方

川大黃

當歸 各二兩

右共為細末每服三錢不拘時溫酒調服

小柴胡湯

方見瘀血泛注

腹痛

傷損腹痛之證如大便不通按之痛甚者瘀血在內也用加味承氣湯下之既下而痛不止按之仍痛瘀血未

盡也用加味四物湯補而行之若腹痛按之反不痛者
血氣傷也用四物湯加參耆白朮補而和之若下而胸
脇反痛肝血傷也用四君子湯加芎歸補之既下而發
熱陰血傷也用四物湯加參朮補之既下而惡寒陽氣
傷也用十全大補湯補之既下而惡寒發熱者氣血傷
也用八珍湯補之下而欲嘔者胃氣傷也用六君子湯
加當歸補之下而泄瀉者脾腎傷也用六君子湯加肉
果補骨脂補之若下後手足俱冷昏憤出汗陽氣虛寒

也急用參附湯若吐瀉而手足俱冷指甲青者脾腎虛寒之甚也急用大劑參附湯口噤手撒遺尿痰盛唇青體冷者虛極之壞證也急用大劑參附湯多有得生者加味承氣湯

大黃

朴硝 各二錢

枳實

厚朴

當歸

紅花 各一錢

甘草 五分

水酒各半煎服

參附湯

人參

或五錢或一兩

製附子

或三錢或五錢

引用薑水煎服

四君子湯

四物湯

俱見傷損出血

六君子湯

方見胸腹疼痛悶

八珍湯

十全大補湯

俱見瘀血泛注

少腹引陰莖作痛

傷損而少腹引陰莖作痛者乃瘀血不行兼肝經鬱火所致宜用小柴胡湯加大黃黃連山梔服之待痛勢已定再用養血之劑自無不愈矣此病若誤認為寒證而投以熱藥重則必危輕則損目治者宜慎之

小柴胡湯

方見瘀血泛注

腰痛

傷損腰痛脊痛之證或因墜墮或因打撲瘀血留於太陽經中所致宜地龍散治之

地龍散

地龍

官桂

蘓木

各九分

麻黃

七分

黃蘗

當歸尾

各二錢五分

桃仁

九箇

甘草

三錢五分

右水煎食前服

眩暈

傷損之證頭目眩暈有因服剋伐之劑太過中氣受傷以致眩暈者有因亡血過多以致眩暈者如兼腹脹嘔吐宜用六君子湯兼發熱作渴不思飲食者宜十全大補湯

六君子湯

方見胸腹
痛悶

十全大補湯

方見瘀
血泛注

煩躁

傷損之證煩躁而面赤口乾作渴脈洪大按之如無者
宜用當歸補血湯如煩躁自汗頭暈宜用獨參湯如煩
躁不寐宜用加味歸脾湯如煩躁脇痛宜用柴胡四物
湯如亡血過多煩躁者宜用聖愈湯

加味歸脾湯

方見胸
腹痛悶

當歸補血湯

聖愈湯

俱見
發熱

柴胡四物湯

即四物湯加柴胡黃芩
方見傷損出血

獨參湯

方見傷損出血

喘咳

傷損之證而喘咳者若因出血過多面黑胸脹胸膈痛而發喘者乃氣虛血乘於肺也急用二味參蘓飲緩則難救若咳血衄血而喘者乃氣逆血蘊於肺也只宜活血行氣不可用下法宜十味參蘓飲治之

二味參蘓飲

人參 一兩

蘓木 二兩

水煎服

十味參蘓飲

人參

紫蘓

半夏

茯苓

陳皮

桔梗

前胡

葛根

枳殼

各一錢

甘草

五分

引用薑二片水煎服

昏憤

傷損昏憤乃傷之至重以致昏憤不知人事宜急灌以獨參湯雖內有瘀血斷不可下急用花蕊石散內化之蓋恐下之因瀉而亡陰也若元氣虛甚者尤不可下亦用前散以化之凡瘀血在內大便不通用大黃朴消血凝而不下者須用木香肉桂二三錢以熱酒調灌服之血下乃生怯弱之人用消黃而必加木香肉桂同煎者乃假其熱以行其寒也

花蕊石散

石硫黃

四兩

花蕊石

二兩

右二味合勻用瓦礫一箇入藥在內封口外用紙筋鹽泥周圍固濟候泥乾安四方磚上書八卦五行字用炭十觔籠疊周圍自午時從下著火漸漸上徹直至經宿炭盡火冷又放經宿礫冷取出研細用絹羅羅過磁盒收貯每服三錢以童便調服作嘔

傷損作嘔若因痛甚或因剋伐而傷胃者宜四君子湯
加當歸半夏生薑因忿怒而肝傷者用小柴胡湯加山
梔茯苓因痰火盛者用二陳湯加薑炒黃連山梔因胃
氣虛者用補中益氣湯加生薑半夏因出血過多者用
六君子湯加當歸

四君子湯

補中益氣湯

俱見傷損出血

小柴胡湯

方見瘀血泛注

二陳湯

六君子湯

俱見胸
腹痛悶

作渴

傷損作渴若因亡血過多者用四物湯加人參白朮如不應用人參黃耆以補氣當歸熟地以補血或用八珍湯若因胃熱傷津液者用竹葉黃耆湯如胃虛津液不足用補中益氣湯如胃火熾盛用竹葉石膏湯若煩熱作渴小便淋瀝乃腎經虛熱非地黃丸不能救

竹葉黃耆湯

淡竹葉

二錢

人參

黃耆

生地黄

當歸

川芎

麥冬

芍藥

甘草

石膏

煨

黃芩

炒

半夏

各一錢

水煎服

竹葉石膏湯

竹葉 三把

石膏 一觔

人參 三兩

甘草 二兩

麥冬 一升

半夏 半升

粳米 半升

引用生薑水煎服

四物湯

補中益氣湯

俱見傷損出血

八珍湯

方見痰血泛注

六味地黄丸

方見肌肉作痛

秘結

傷損之證大便秘結若因大腸血虛火熾者用四物湯送潤腸丸或以豬膽汁導之若腎虛火燥者用六味地黃丸若腸胃氣虛用補中益氣湯若大便秘結裏實氣壯腹痛堅硬者用玉燭散

潤腸丸

大黃

當歸尾

羌活

各五錢

桃仁

麻仁

各一兩

右為末煉蜜丸彈子大空心白湯送下

豬膽汁導法

大豬膽一枚瀉汁和法醋少許以灌穀道內如一時頃當大便出宿食惡物甚效

玉燭散

生地黃

當歸

川芎

赤芍藥

大黃

酒浸

芒硝

引用生薑水煎服

四物湯

補中益氣湯

俱見傷損出血

六味地黃丸

方見肌肉作痛

挾表

傷損之證外挾表邪者其脈必浮緊證則發熱體痛形氣實者宜疎風敗毒散形氣虛者宜加味交加散或羌活乳香湯以散之

疎風敗毒散

當歸

川芎

白芍藥

熟地黃

羌活

獨活

桔梗

枳殼

柴胡

白茯苓

白芷

甘草

紫蘓

陳皮

香附

右生薑生地黃煎入酒和服

加味交加散

當歸

川芎

白芍藥

生地黃

蒼朮

厚朴

陳皮

白茯苓

半夏

羌活

獨活

桔梗

枳殼

前胡

柴胡

乾薑

肉桂

甘草

右生薑煎服

有熱者去乾薑肉桂

羌活乳香湯

羌活

獨活

川芎

當歸

赤芍藥

防風

荊芥

丹皮

續斷

紅花

桃仁

乳香

右生地黃煎服

有熱者加柴胡黃芩

欽定四庫全書



卷九十

補遺方

補損續筋丸

治跌打撲墜骨碎筋斷肉破疼痛不息

當歸

五錢
酒洗

川芎

白芍

炒

熟地

各三錢

廣木香

丹皮

乳香

去油淨

沒藥

各五錢
去油淨

骨碎補

自然銅

紅花

瓜兒血竭 各三錢

朱砂 五錢

丁香 一錢

人參 一兩

虎骨 二兩
酥油炙

古銅錢 三文

共為細末煉蜜為丸每服三錢淡黃酒童便化服
補損接骨仙丹

治證同前

當歸 酒洗

川芎

白芍

炒

熟地

補骨脂

五靈脂

廣木香

地骨皮

防風

各五錢

乳香

去油淨

沒藥

去油淨

瓜兒血竭

各一錢

右剉一處用夜合花樹根皮五錢同入大酒壺內
加燒酒同煮一炷香取出溫服

止血定痛生肌散

治傷損等證失血過多或因剋伐致血氣耗損惡寒發熱煩躁

乳香

去油淨

沒藥

去油淨

龍骨

各三錢

血竭

二錢

黃丹

五錢飛過

香白芷

二錢五分

軟石膏

一兩煨去火毒

潮腦

少許

共為細末磁器盛之每以糝患處止痛生肌

數跌打青腫方

生梔子同飛羅麵搗塗之以布纏裹拔出青毒即消

回陽玉龍膏

耑敷跌打損傷氣虛寒冷

草烏

二錢
炒

南星

一兩
煨

軍薑

一兩
煨

白芷

一兩

赤芍

一兩
炒

肉桂

五錢

共為末葱湯調搽熱酒亦可

太乙膏

治傷口不收貼之生肌長肉


香麻油

當歸

生地

生甘草

三味入油內燂枯去渣再以絲棉濾淨再入淨鍋
熬至滴水不散入炒飛黃丹八兩又用慢火熬至
滴水成珠取起少傾入白蠟黃蠟各一兩微火再
熬取起少定入去油淨乳香沒藥各五錢攪勻收
磁器內過三宿可貼



御纂醫宗金鑑卷九十